

MAMSEL CLINIX POLİVİDON

Aktif maddenin adı ve miktarı (%-a/h): Polivinil pirolidon-iyot (CAS: 25655-41-8) %10

Yardımcı maddenin adı ve miktarı (%-a/h): Etil alkol (CAS 64-17-5) %8, %1.6 Gliserin, %0.072 Mentol, %0.14 Sodyum hidroksit, %0.46 Sodyum asit fosfat, %79 Deiyonize su

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

SIÇRAMA TEHLİKESİ VARSA KORUYUCU GÖZLÜK VEYA YÜZ SİPERİ TAKINIZ. UYGULAMA VE HAZIRLIK AŞAMASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ. İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ. HARİCEN KULLANINIZ. YUTULMAMALI, GÖZE UYGULANMAMALIDIR.

Boş ambalaj imha şekli: Usulüne uygun olarak imha ediniz.

Ürün tipi 1: İnsan hijyeni ile ilgili biyosidal ürünler.

Zehirlenme belirtileri: Mide bulantısı dahil mide-barsak rahatsızlığı belirtileri.

Polivinil pirolidon-iyot Ağızdan LD50 = 8000 mg/kg (büyük sıçan)

İlkyardımlar önlemleri: Solunması halinde, maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarınız. Burnu ve ağzı suyla çalkalayınız. Yutulması halinde, ağzı iyice çalkalayınız. Deriyle temas halinde, kazazedeyi kirlenme yerinden uzaklaştırınız. Kirlenmiş giysileri çıkarınız. Deriyi hemen sabun ve suyla yıkayınız. Gözle temas halinde, kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayınız. En az 15 dakika durulamaya devam ediniz. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde doktora başvurunuz.

Antidotu ve gerekli bilgiler: Bilinen antidotu bulunmamaktadır.

ZEHİRLENME DURUMLARINDA ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM)'NİN 114 NO'LU TELEFONUNU ARAYINIZ.

Ürün kullanılırken ve depolanırken dikkat edilecek hususlar: İyoda karşı hassasiyeti olan kişilerde, non-toksik nodüler guatrı olan kişilerde kullanılmamalıdır. Yeni doğan bebeklerde (1 aylıktan küçük) kullanılmamalıdır. Uzun süreli ve geniş yüzeylere uygulamaktan kaçınılmalıdır. Kalp yetersizliği veya hipertroidi olan kişilerde kullanılmamalıdır. Kadınlarda hamileliğin 3. ayından itibaren ve süt veren annelerde kullanılmamalıdır. Sıkı sıkı kapalı orijinal ambalajında ve kuru ve serin bir yerde depolayınız. Direkt güneş ışınları dahil, ışıktan koruyunuz. Uzun süre aşırı ısıdan sakınınız. Diğer kimyasallarla karıştırmayınız. Kirlenmiş ambalajları tekrar kullanmayınız. Lağım, su yollarına veya toprağa sızmamalıdır.

Önlem ifadeleri:

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın

P305+P351+P338: Göz ile teması halinde; su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P301+P312: Yutulduğunda; kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ'NİN 114 NO'LU telefonunu veya doktoru arayın.

Sağlık Bakanlığı Ruhsat Tarihi ve Numarası: 05.03.2008 - 2013/174

Kullanılacağı Zararlı Organizmalar:

| Zararlı türü-Yaşam evresi | Uygulama alanı ve şekli | Uygulama dozu |
|--|--|---------------|
| Bakteriler: -Staphylococcus aureus -Pseudomonas aeruginosa -Enterococcus hirae -Escherichia coli Mantarlar: -Aspergillus brasiliensis -Candida albicans | Mukoza dezenfeksiyonunda, Cerrahide: ameliyat öncesi sahanın hazırlanmasında, enjeksiyon, kan alma işlemlerinde kullanılır. | 3-5 ml |

Kullanma şekli: Polividon seyreltilmemiş şekliyle dezenfekte edilecek bölgeye sürülür. Oluşan gözenekli film tabakası daha sonra yıkanarak temizlenebilir. Ayrıca tampon yaparak da kullanılabilir. Temas süresi 2-5 dakikadır.

Üretici firmanın adı ve adresi: Mamsel İlaç San. ve Tic. AŞ.

İstanbul Anadolu Yakası Org. San. Bölg. Gazi Bulvarı No: 50/A Tuzla 34953 İstanbul Tel: 0216 593 13 47-48

Ruhsat sahibinin adı ve adresi: Mamsel İlaç San. ve Tic. AŞ.

Kuşbaşı Cad. No: 37 Altunizade/Üsküdar 34662 İstanbul Tel: 0216 554 05 84-85-86

Net miktarı: 30 ml, 100 ml, 1000 ml

Ambalajı açılmış ürünü 3 ay içerisinde kullanınız.

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında raf ömrü 24 aydır.

GENEL HALK KULLANIMI İÇİNDİR.

KULLANMADAN ÖNCE ETİKETİ ve PROSPEKTÜSÜ MUTLAKA OKUYUNUZ.